

La bague au doigt

Ben et Julien, 2 potes prennent un café. Ben sort depuis 3 mois avec Géraldine. Discussion de comptoir.

Et là, elle m'a dit:
"Je t'aime"...



Attends, je la
connais, côté sexe,
elle n'a rien à se
reprocher.

T'es foutu! Bientôt marié,
une maison, 3 enfants...

On se calme!
On n'a toujours pas
arrêté les capotes.

Alors,
il serait temps
de faire un test...

Ok, j'ai compris.
Allez, je me casse!

Ouais, comme toi: Sandrine,
Céline, Karine, Caroline...
et comment elle s'appelait
déjà l'Allemande?!...

Attends, Ben. Pourquoi
tu t'en vas comme ça?

Je vais faire
le test!!!

49% des personnes dont le sida a été diagnostiqué en 2003 ignoraient leur séropositivité, excluant toute prise en charge précoce de leur infection.

JOUEZ LA CARTE DU DEPISTAGE

- **En cas de prise de risque:** rapport sexuel sans préservatif avec une personne de statut sérologique inconnu ou accident de préservatif pendant le rapport sexuel (déchirement ou glissement). Un premier test de dépistage du VIH/sida peut être réalisé quinze jours minimum après la prise de risque.
- **Et si vous souhaitez abandonner le préservatif dans le cadre d'une relation stable**



Consultez votre médecin traitant ou un médecin dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Il existe au moins une CDAG par département.

Pour connaître l'adresse de la CDAG la plus proche :

Sida info service 0 800 840 800 ou www.sida-info-service.org



**Ministère de la Santé
et de la Protection sociale**

Institut National
de Prévention
et d'Éducation
pour la Santé

inpes
www.inpes.sante.fr