

Ce soir tu risques de
sucrer la

gryffory qui a sucé
grégoire qui a sucé fred
et sylvain qui ont sucé

pierre et philippe qui ont
sucé loïc et louis qui ont

sucé thomas qui a sucé
tristan qui a sucé antoine
et mathieu qui ont sucé

luc et alexandre qui ont sucé
luc et alexandre qui ont sucé

luc et alexandre qui ont sucé
luc et alexandre qui ont sucé

Signes possibles : chancre (petite plaie indolore), éruption sans démangeaisons sur la peau et les muqueuses. Ces signes ne sont pas systématiques. Ils peuvent apparaître entre 2 et 4 semaines (ou plus) après la contamination, puis disparaître.

Dépistage : prise de sang ou examen médical.

Traitement : antibiotique.

Risques et complications : atteinte du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères et des yeux.

Pour vous protéger, faites-vous régulièrement dépister et utilisez un nouveau préservatif ou un gant et un lubrifiant à base d'eau ou de silicone à chaque pénétration avec tous vos partenaires.

Faites le test. Protégez-vous.

Plus d'informations sur les IST sur
www.havefun.fr



Sida Info Service
0 800 840 800
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sida-info-service.org

