


VACCINATION

... LE POINT

SUR LA COQUELUCHE

LES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS DU HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ (19 MARS 2008)



PENSER AU RAPPEL DES ADOLESCENTS ET DES ADULTES AU CONTACT DES NOURRISSONS

Les cas de coqueluche chez les **enfants de plus de 6 mois** ont quasiment disparu grâce à une couverture vaccinale élevée chez les nourrissons. Celle-ci doit être maintenue car la coqueluche circule encore dans la population.

L'enjeu est d'éviter les cas de coqueluche chez les **nourrissons de moins de 6 mois**, non encore protégés par la vaccination et à risque de coqueluche grave, potentiellement mortelle. Ces nourrissons sont le plus souvent contaminés par un adulte⁽²⁾, un des parents dans 50% des cas (l'immunité, qu'elle soit acquise par la vaccination ou la maladie, s'estompe au bout d'environ une dizaine d'années, de sorte que tous les adultes sont potentiellement réceptifs à la coqueluche). D'où la stratégie retenue d'effectuer un rappel du vaccin coqueluche chez les **adultes au contact de nourrissons** (stratégie dite du cocooning).

En France, il existe en 2008 **deux vaccins** quadrivalents **dTcaP** contenant les valences diphtérie faible dose (d), tétanos (T), coqueluche acellulaire faible dose (ca), et polio (P) adaptés à la vaccination des adolescents et des adultes (Repevax® et Boostrixtetra®).

EN PRATIQUE, QUI VACCINER ?

À l'âge de 11-13 ans, le rappel du vaccin coqueluche vise à protéger les adolescents et les adultes et à couvrir les premières années de la fécondité. Il faut différer ce rappel à l'âge de 16-18 ans chez ceux qui auraient reçu, hors recommandation, un rappel coquelucheux à l'âge de 5-6 ans.

À l'âge de 16-18 ans, à l'occasion d'un rappel diphtérie-tétanos-polio, un rattrapage avec un vaccin quadrivalent dTcaP permet de vacciner les adolescents qui n'auraient pas été vaccinés à 11-13 ans.

Pour plus d'informations

- ▶ Ministère chargé de la santé : www.sante.gouv.fr (dossier coqueluche)
- ▶ HCSP : www.hcsp.fr
- ▶ InVS : www.invs.sante.fr (dossier thématique coqueluche)
- ▶ Afssaps : www.afssaps.fr
- ▶ Inpes : www.inpes.sante.fr (guide des vaccinations)

Chez les adultes, un rappel du vaccin coqueluche est à proposer aux couples ayant un projet parental. Lors d'une grossesse, il convient de s'assurer que les personnes, enfants, adolescents et adultes, qui vivront au contact de l'enfant à naître pendant ses 6 premiers mois de vie, sont correctement vaccinées contre la coqueluche (enfant à jour selon le calendrier vaccinal, personne ayant reçu une dose à l'âge adulte). A défaut, une vaccination devrait leur être proposée : la vaccination de l'entourage est à réaliser durant la grossesse et celle de la mère doit être différée immédiatement après l'accouchement, celle-ci pouvant être effectuée même en cas d'allaitement.

Afin de renforcer la stratégie précédente, dite du cocooning, une dose de vaccin dTcaP est à proposer à tout adulte n'ayant pas reçu de rappel de vaccin coqueluche depuis plus de 10 ans, notamment à l'occasion du **rappel vaccinal à l'âge de 26- 28 ans**.

Tous les professionnels de santé devraient être vaccinés contre la coqueluche, et en priorité ceux travaillant auprès de nourrissons de moins de 6 mois. Il en est de même des professionnels de la petite enfance.

Les vaccins coqueluche disponibles sont sous forme combinée à d'autres vaccins. Pour les adultes, **le délai séparant l'administration d'un vaccin contenant les valences d et/ou T d'un vaccin dTcaP** peut être ramené à 2 ans. Ce délai peut être ramené à 1 mois dans un contexte de cas groupés de coqueluche en collectivité. Enfin, en l'état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses répétées, **une seule dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio est à administrer chez l'adulte**.

1 / Avis du Haut Conseil de la santé publique du 19 mars 2008 relatif aux recommandations vaccinales contre la coqueluche (<http://www.hcsp.fr>).

2 / Une toux prolongée depuis plus de 7 jours, sans explication claire chez un adulte, doit faire évoquer le diagnostic de coqueluche.

