

Sous la douche

Pierre et Daniel, forment un couple libre, chacun est au courant des relations extra-conjugales de l'autre, mais en parler, surtout quand on a pris un risque, n'est pas simple...



Une bombe ce mec...
mais sans capote... j'ai encore
déconné, moi... bon, 3h00 du
mat, faut que je dorme...



Pff... j'espère que
tu t'es amusé...



Ça va. Dors.



Le p'tit dej...
ça me rend
chaud...

Ben, moi pas
trop ce matin...



T'es sûr que
t'as pas envie ?

Pourquoi
j'ai pas mis de capote
hier ?



Tu viens me rejoindre ?

Je suis déjà
à la bourre là...



T'es sûr...

Faut que
je lui dise...

49% des personnes dont le sida a été diagnostiqué en 2003 ignoraient leur séropositivité, excluant toute prise en charge précoce de leur infection.

JOUEZ LA CARTE DU DEPISTAGE

- **En cas de prise de risque:** rapport sexuel sans préservatif avec une personne de statut sérologique inconnu ou accident de préservatif pendant le rapport sexuel (déchirement ou glissement). Un premier test de dépistage du VIH/sida peut être réalisé quinze jours minimum après la prise de risque.
- **Et si vous souhaitez abandonner le préservatif dans le cadre d'une relation stable**



Consultez votre médecin traitant ou un médecin dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Il existe au moins une CDAG par département.

Pour connaître l'adresse de la CDAG la plus proche :

Sida info service 0 800 840 800 ou www.sida-info-service.org

SI VOUS AVEZ PRIS UN RISQUE IL Y A MOINS DE 48 HEURES :

rendez-vous le plus tôt possible aux urgences d'un hôpital, si possible avec votre partenaire, en vue d'un traitement pouvant éviter la contamination.



Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

Institut National
de Prévention
et d'Éducation
pour la Santé

inpes
www.inpes.sante.fr